

Factores que predisponen a una fractura de cadera en el anciano, a propósito de un caso PDF - Descargar, Leer

Factores que predisponen a una fractura de cadera en el anciano, a propósito de un caso

Rocio Navarro Cobo / DNI: 75256823-H
, Ana Isabel Hernández Illán,
Beatriz Martínez Vicente, Carlos
Hernández Hernández, Clara María
Arias Fernández, Leticia Torres
Corbalán, Isabel González Breis,
Miguel Moreno Gutiérrez

DESCARGAR

LEER

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción

Introducción y objetivos: las fracturas de cadera son las más prevalentes en la población anciana, son estimadas entre 70% y el 90% son producidas por caídas o por la fragilidad de sus huesos. La fractura de cadera se producen aproximadamente unas 33.000 al año en personas mayores de 75 años o más. Se trata de pacientes, la gran mayoría de sexo femenino, con múltiples patologías. Los objetivos del estudio son: conocer causas, factores que predisponen a padecer una fractura de cadera, identificar los tipos de fractura de cadera, describir los cuidados enfermeros de una fractura de cadera. Metodología: es un estudio cualitativo, tipo de estudio de caso cuyo período abarcó desde el 26 de Septiembre 2011 al 27 de Enero de 2012 en la unidad de quirófano del Hospital de Molina de Segura. La fuente de información empleada para su realización han sido la historia clínica del paciente, la valoración de enfermería, examen físico de la paciente y la exhaustiva revisión de la literatura en bases de datos de ciencias de la salud. Resultados: permitieron identificar los diagnósticos enfermeros: riesgo de infección; deterioro de la movilidad física. Con este plan individualizado conseguiremos mejorar en la calidad de vida del paciente. Para ello, ejecutaremos una serie de intervenciones fundamentales para conseguir los resultados propuestos y una rápida

recuperación. Discusión y limitaciones: falta de tiempo para llevar a cabo mi proyecto, recursos que fueran accesibles a mi corta experiencia investigadora. Modificando los factores de riesgo de riesgo, podremos reducir su alta prevalencia en la población anciana. Conclusión: promover una mayor dedicación a los factores de riesgo de las fracturas, ya que muchos de ellos podrían ser disminuidos y sin grandes costes sanitarios.

factores de riesgo que han sido documentados en el mundo y en el país buscando identificar áreas de . económico, que predisponen la ocurrencia de estas lesiones accidentales (fase pre- evento), que propician los .. Uso de protectores de cadera en personas con riesgo de fractura de la cadera en caso de caída.

Chichester, UK: John Wiley & Sons,. Ltd.). – Montero Pérez-Barquero M, García Lázaro M., Carpintero Benítez P. Desnutrición como factor pronóstico en ancianos con fractura de cadera. Med Clín (Barc). 2007; 128: 721-5. – Moreiras O, Carbajal A, Perea I, Varela-Moreiras. G, Ruiz Roso B. Nutrición y salud en las personas.

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en el postoperatorio del adulto mayor con fractura de cadera en el hospital Víctor lazarte. Echegaray. . Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo, analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo.

Prevención de Complicaciones de la Circulación Sanguínea en la Vejez, Aceptado. Factores de riesgo relacionados con la claudicación familiar en pacientes geriátricos: revisión literaria, Aceptado. Calidad de vida en el paciente celíaco, Aceptado. Cuidado multidisciplinar en el paciente con Alzheimer, Aceptado. Calidad.

El objetivo de esta investigación fue determinar las características de la morbilidad por fracturas de caderas (FC) en la provincia de Pinar del Río en el . caídas accidentales (87,5 % de los casos) constituye un importante problema de salud en la tercera edad. El lugar . de los traumatismos en pacientes ancianos, con una.

editorial por el contenido de esta guía, declaran que no tienen conflicto de intereses y en caso de haberlo lo han . Debe ser citado como: Manejo Médico Integral de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor. México: ... El anciano es portador de múltiples comorbilidades y factores de riesgo que predisponen a fractura de.

cuenta que la función del ser humano es el verdadero objetivo de su profesión. De qué vale salvar una vida o . Todos estos factores predisponen a la pérdida de funciones y requieren intervenciones precoces .. fractura de cadera intervenida quirúrgicamente, que no caminaban previamente o lo hacían con dificultad.

2.1 Un plan personalizado de cuidados se basa en los datos de la valoración, los factores. IV de riesgo identificados . 3.6 En el caso de pacientes de alto riesgo que se sometan a una

intervención quirúrgica,. La conviene plantearse el .. Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores.

21 Aug 2017 . The Haindl Tarot: The Major Arcana · Crossover Queries: Dwelling with Negatives, Embodying Philosophy's Others (Perspectives in Continental Philosophy) · ÜBER UNS · MARKEN · KONTAKT · The Haindl Tarot: The Major Arcana · Crossover Queries: Dwelling with Negatives, Embodying Philosophy's.

terceras partes de los ancianos que se caen sufrirán una nueva caída en los siguientes seis meses. Es decir, la caída es un factor de riesgo per se de sufrir nuevas caídas. El registro en la historia clínica de ante- cedente de caída se considera un factor predictor de fractura de cadera en el futuro (2). La mayoría de las.

Las caídas producen en el paciente anciano una elevada morbilidad y mortalidad (88% de fractura de cadera). . En la mayoría de los casos se trata de una inadaptación entre el anciano y su entorno de origen multifactorial; el riesgo de sufrir una caída aumenta linealmente con el número de factores de riesgo existentes.

La edad no es una enfermedad, pero es un factor de riesgo independiente para morbilidad . Las caídas ocasionan cerca del 90% de fracturas de cadera en el anciano. .. Propósito. Realizar un estudio descriptivo tomando una cohorte retrospectiva de pacientes con diagnóstico de fractura de cadera de origen traumático.

En España se producen anualmente unas 33.000 fracturas de cadera. La incidencia global es de unos 517 casos por 100.000 ancianos y año (270 casos/100.000 varones y. 695/100.000 mujeres). Son más frecuentes en mujeres, debido a la elevada prevalencia de osteoporosis, y su incidencia aumenta con la edad;

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal en adultos mayores del Módulo Barrio Adentro 1 de Chirica Vieja de la parroquia Chirica San Félix municipio Caroní del estado Bolívar con el objetivo de determinar el comportamiento de los factores de riesgo, ocurrencia y consecuencias de las caídas de los.

Entre los numerosos factores que pueden inducir rabdomiolisis figura el aplastamiento de las extremidades. La interrupción de la perfusión de los tejidos en un grupo muscular provoca el síndrome de aplastamiento. Los mecanismos lesivos pueden consistir en traumatismo muscular directo, traumatismo cerrado o.

En pacientes con enfermedad cardiovascular o con diabetes el objetivo es un co- lesterol total < 175 .. (HTA) cuando solamente se practica este tipo de ejercicio. En caso de ser portador de una enfermedad degenerativa crónica o en personas mayores, es totalmente necesario .. Menor riesgo de fractura de cadera.

fallas activas, prácticas seguras y factores contributivos de los paquetes aplica- ... OBJETIVO. GENERAL. INTRODUCCIÓN. IR AL ÍNDICE. 23. FACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción insegura (falla ... La fractura de cadera es la complicación más seria, en 20% de los casos.

30 Jul 2012 . 89 Frecuencia de fracturas en una unidad de atención primaria. Eduardo . CASOS CLÍNICOS. 109.Mola hidatiforme: a propósito de un caso. Leidy L. Mateo. Ruiz, Carolina Méndez Rodríguez, Jaime Jorge Manzur, Adriana Oliart, .. demás factores cardiovasculares que predisponen a la aparición.

La etiología es multifactorial, pero se puede clasificar en factores intrínsecos y extrínsecos. (Tabla III). La mayoría .. pitalarias y requiere una actuación rápida, con el objetivo de conseguir un buen patrón respiratorio. . que predisponen al asma de riesgo vital estableciendo la gravedad de la crisis asmática del paciente.

¿Cuáles son los principales factores que predisponen a la depresión al adulto mayor? 2. ¿Cuáles son las .. En el caso de no contar con GPC como documento de referencia, las

evidencias y recomendaciones fueron elaboradas a través del ... La depresión es común después de la fractura de cadera y el mayor periodo.

OBJETIVO GENERAL: Determinar la prevalencia de caídas en adultos mayores y sus factores . a disminuir las caídas. **PALABRAS CLAVES:** caídas, adulto mayor, factores asociados, seguridad, riesgo. ... como fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos, que reducen la movilidad e independencia, y.

El problema de las caídas en los adultos mayores engloba toda una compleja situación, teniendo sus propios factores de riesgo, consecuencias físicas en términos de .. Tal vez la consecuencia más temida de una caída es la fractura de cadera, con 200,000 casos/año en Norteamérica la mayoría de los cuales ocurren en.

INVESTIGACIÓN: PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN. PACIENTES CON FRACTURA. DE CADERA. Autor/a: Lucía Ruiz Hernández. Tutor/a: Agustín Mayo Iscar ... ancianos con fractura de cadera previa, puede disminuir el riesgo de caídas, de nuevas fracturas y mejorar su calidad de vida. 3. Objetivos. Objetivo general:.

INSTITUCIONALIZADAS: UN ESTUDIO DE CASO||, que ha realizado el .. imprecisos y dependientes, entre otros factores, de la esperanza promedio de vida al nacer de cada población. Según Romero (2002, p. 204), la vejez se .. las personas que se caen sufren una fractura (1% de éstas son de cadera). El.

Fractura de cadera; anciano; factores de riesgo; rehabilitación de cadera; unidades de ortogeriatría. **ABSTRACT** . en muchos casos a la vejez, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, demencia . Existen una serie de factores de riesgo que predisponen a la persona a sufrir este problema.

Se estima que aproximadamente el 10% de las caídas conducen a fracturas, siendo las más frecuentes antebrazo, cadera y húmero. Dentro de los . Cambios que predisponen a las caídas . Las caídas en el anciano suelen ser de etiología multifactorial, asociando factores ambientales, enfermedades y medicamentos.

ancianos y la misma está asociada a varios factores de riesgo. **Objetivo:** Determinar los factores asociados a la fractura de cadera en pacientes mayores de 65 años en el Hospital "Dr. Salvador Allende". **Método:** Se realizó, en el 2013, un estudio epidemiológico observacional analítico de casos y controles. Los casos.

1 Feb 2013 . se consideran un factor de riesgo importante para presentar determinadas enfermedades físicas crónicas .. comparativos de la prevalencia de obesidad en distintos países europeos, en el caso de. España ... las fracturas de cadera en las mujeres posmenopáusicas, debido a que produce un incremento.

ancianos con fractura de cadera y su relación con la edad, las complicaciones postoperatorias, las comorbilidades, el tipo y el tiempo de la cirugía y los demás factores que han sido asociados en la literatura mundial. En Antioquia se cuenta con escasas estadísticas documentadas al respecto (7). El propósito de este.

7. 3. INTRODUCCION . 9. 4. MARCO TEORICO . . 13. 4.1. Factores intrínsecos . 18. 4.2. Factores ambientales . 21. 5. OBJETIVOS . . 23. 5.1. Objetivo general . . 23. 5.2. Objetivos específicos . 23. 6. .. mayor parte de los casos, los Adultos Mayores presentaron Fractura de Colles, del tipo cerrada no patológica; producto de.

Jaén, que me han facilitado el contacto con los ancianos y ayudado a recoger los datos . los ancianos. Gracias, a todos los ancianos y sus familias que me han abierto las puertas de sus casas y han compartido su tiempo y sus vivencias conmigo. Gracias a ... Predicción: Factores que predisponen a la fractura de cadera.

Factores que predisponen a una fractura de cadera en el anciano, a propósito de un caso: Introducción y objetivos: las fracturas de cadera son las.

Objetivo. La presente revisión constituye una puesta al día del llamado síndrome confusional agudo (delirium) contemplado desde la perspectiva del geriatra. Desarrollo. A efectos . destacan los principales factores de riesgo que incluyen desde los cambios .. gresada por fractura de cadera lo presentaron el. 48% [25].

En el caso del módulo cinco, se trata de un módulo integrador, que recoge los resultados de los módulos anteriores; si bien algunas de las actividades propuestas .. En el caso de una fractura, ¿qué medidas debemos tomar? .. la fractura de algún hueso (es frecuente la rotura de cadera en las personas mayores), lo.

los progresos del paciente, teniendo que utilizarse en este caso durante al menos 2 meses. C. Para evaluar .. los factores del estilo de vida que afecten a la calidad del sueño y la contribución que algunos fármacos pueden tener .. este objetivo se pretende mejorar la calidad de la atención a los pacientes con insomnio y.

Noté 0.0/5: Achetez Factores que predisponen a una fractura de cadera en el anciano, a propósito de un caso de Rocío Cobo Navarro, Ana Isabel Hernández Illán, Beatriz Vicente Martínez, Carlos Hernández Hernández, Clara María Arias Ferrández, Leticia Corbalán Torres, Isabel Breis González, Miguel Gutiérrez.

18 Ene 2011 . EFICACIA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIFACTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LOS ANCIANOS DE LA COMUNIDAD.

VICTORIANO ... factores de riesgo de la salud y ambientales (1,9,13). , siendo la más frecuente de todas la fractura de cadera, que además,,

1 Nov 2013 . Estos son los principales factores de riesgo, para padecer fracturas frente a mínimos traumatismos o por fragilidad (las más frecuentes son: cadera, muñeca, columna, ésta última pasa muchas veces desapercibida por el paciente y el médico si no se las busca intencionadamente). 1) Edad avanzada (a).

Se expone el caso de una mujer de 81 años con fractura cerrada de cadera, pluripatología, y que vive con su hija. . Por otro lado, factores como pueden ser una baja actividad física y el escaso uso de medicación contra la osteoporosis podrían contribuir a la elevación de la incidencia de las fracturas de cadera7. Además.

La fractura de cadera es una de las patologías más frecuentes del anciano; en nuestro país la incidencia anual oscila alrededor de 115 fracturas en varones y 252 en mujeres por . En la medida de lo posible hay que modificar estos factores, siendo en algunos casos imposible, como, por ejemplo, en los constitucionales.

frecuentes en la osteosíntesis por fractura de cadera en pacientes ... 99% de casos. Los factores de comorbilidad de mayor incidencia en este grupo de pacientes en orden de frecuencia fueron: Hipertensión Arterial 66% seguido de diabetes .. elementos que predisponen a la fractura de cadera se los ha dividido en dos.

medades transmisibles en la vejez, están la tuberculosis .. la prevención de discapacidades y la protección de la independencia. El objetivo es identificar tempranamente factores de riesgo o señales oportunas de deterioro antes de .. La fractura de cadera o de fémur son dos de las complicaciones más importantes de.

pretende complementar la que ofrecen los profesionales sanitarios y en ningún caso reemplazarla. Por la misma razón, si la . sus factores pronósticos y sus síntomas, y alerta sobre la importancia del diagnóstico y el .. grandes, como las rodillas y las caderas, el cartílago articular tiene. Cápsula articular. Membrana.

Cirugía ortopédica mayor. Se engloban en esta categoría tres cirugías ortopédicas que comparten un riesgo elevado de ETV en caso de no recibir una profilaxis antitrombótica adecuada. Dichas cirugías son la Artroplastia Total de Rodilla (ATR), Artroplastia Total de Cadera (ATC) y Cirugía por Fractura de Cadera (CFC).

21. Mejora de calidad en la asistencia hospitalaria del paciente anciano con fractura de cadera. Improved quality of hospital care of elderly patients with hip fracture. SÁEZ LÓPEZ P, VALVERDE GARCÍA JA, FAOUR MARTÍN O, ET AL. 30. Absceso de Brodie como forma de osteomielitis subaguda: a propósito de un caso.

La incidencia de diversos factores mecánicos y funcionales, infecciosos, genéticos o inmunológicos . incluso de muerte. Aunque las caídas tienen a veces una causa única, en la mayoría de los casos es la .. El objetivo del tratamiento quirúrgico de las fracturas de cadera en el anciano, es conseguir una fijación.

comunes a varias enfermedades de la vejez son la confusión, las caídas, la .. Factores de riesgo. Módulo 5. Valoración de la marcha y del balance. Examen de salud oral. Valoración del medio ambiente. Escala de Tinetti. Examen oral .. La fractura de cadera es uno de los eventos más frecuentes y más temidos de la.

Baja” tiene por objetivo determinar los riesgos de experimentar accidentes en el adulto .. del adulto mayor, y en otros casos sobreestiman dichas capacidades, .. fracturas en el hogar.

Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Base. Osorno” cuyo objetivo fue: Determinar los factores de riesgo que predisponen.

El propósito de efectuar un seguimiento de tres meses a los pacientes con endoprótesis total de cadera, es el de .. Dentro de los factores que predisponen a la enfermedad podemos encontrar: el género femenino ... Se excluyen de las recomendaciones anteriores los casos de injertos óseos, fracturas periprotésicas.,

atendidos en su domicilio (crónicos, ancianos frágiles, terminales, etc.) su historia puede que haya sido . El objetivo principal de la valoración del cuidador como recurso es identificar problemas en el ámbito del . sus características definitorias (en el caso de problemas reales) o sus factores de riesgo (problemas de.

El mismo que tiene como propósito, aplicar el proceso de Atención de. Enfermería . patologías asociadas en muchos casos a la vejez, como por ejemplo . 60 años”3. ETIOLOGIA:

FACTORES DE RIESGO PARA FRACTURA DE. CADERA: En el agente causal de las fracturas de cadera en el adulto mayor, tenemos un.

sido abordada. El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la prevalencia de fractura de cadera en ancianos de instituciones de beneficencia de la provincia de Santiago. Secundariamente se estudiaron los factores de riesgo asociados con el fin de contribuir a la elaboración de estrategias preventivas.

3 May 2012 . Unidos; además, es la principal causa de fracturas en ancianos. Diez millones . fracturas de cadera, 547.000 fracturas vertebrales y 135.000 fracturas de pelvis2. El alendronato es un . Se presenta un caso de una fractura femoral atraumática en una mujer de 42 años en terapia con alendronato durante.

contra de su voluntad. Objetivo: Identificar los factores que influyen en las caídas de pacientes hospitalizados. Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de enero a diciembre de 2008; se incluyeron los casos de pacientes ... Unido destacan que las fracturas de cadera en personas mayores se.

enfermos que han sufrido una fractura de cadera es del 12-20% más alta que entre aquellos de igual edad y sexo . El objetivo terapéutico en el tratamiento de las fracturas en el anciano es la recuperación precoz de la función. . distintos tipos de fracturas, siendo las caídas un factor precipitante en el 90% de los casos.

La fractura de cadera en ancianos es la causa más común de hospitalización en el . Objetivo: Determinar los factores pronósticos de mala . millones de casos. (10). Existen toda una serie de factores relacionados con la mortalidad y la recuperación funcional como la edad, sexo, tipo de fractura, tiempo transcurrido.

Este resultado para *Phytomyza* es similar al de *Colletotrichum* en el sentido de que la probabilidad de que sea un falso positivo es menor que el 5%.